

Strålbehandling

Införing av siktmärken i prostata

Införing av siktmärken (guldkorn)

Man skall laga in siktmärken i din prostata för positionering av strålbehandling.

För att förhindra inflammation används ett antibiotikum som du får med dig vid första möten med din radiolog och ska ta en timme före införandet av guldkorn. Det är viktigt att tarmen töms före operationen. Om tarmen inte fungerar regelbundet, ska du börja medicinering som befrämjar tarmfunktion, t.ex. Pegorion® eller Levolac®. Läkemedlet bör startas 2 till 3 dagar före införandet av guldkorn.

Eftersymptom

Efter införing av siktmärkena kan du eventuellt upptäcka blod i urin, sädesvätska eller avföring. Drick riktligt med vatten eller svag saft (cirka 1,5 – 2 liter per dag) några dagar efter åtgärden. Det här ökar urinutsöndringen och lindrar symptomen.

På åtgärdsdagen ska du undvika att anstränga dig eller bada bastu. Normalt sexliv är tillåtet.

Lindriga smärtor i nedre buken och blödningar kan förekomma 1 – 2 dagar efter åtgärden. Det kan förekomma blod i sädesvätskan upp till 2 – 3 månader efter åtgärden.

Sällsynta symptom efter inläggning av siktmärken:

- urinvägsinfektion
- plötslig hög feber
- det går inte att urinera

Kontakta i dessa fall omedelbart hälsovårdscentralen eller sjukskötaren på strålbehandlingspolikliniken, telefon 03 311 63140.