

Tays / Lungsjukdomar

Endoskopi av luftrören

Endoskopi av luftrören det vill säga bronkoskopi görs under lokalbedövning med ett tunt, böjligt rör med en kamera i andra änden med vars hjälp luftrören kan undersökas. I samband med undersökningen är det möjligt att ta prover av slemmet i luftrören eller små vävnadsprov av slemhinnan.

Alla patienter kallas till endoskopi av luftrören under morgonen. Tiden i kallelsen är inte undersökningstiden, utan ordningen fastställs under dagen. Reservera sju timmar för ditt besök. **Du ska inte äta och dricka under sex timmar före undersökningen. Rök inte på undersökningsdagens morgon.**

Medicinering

Ta de hjärt-, blodtrycks- och astmaläkemedel som ordinerats som regelbunden medicinering, om läkaren inte har ordinerat annat, med en liten mängd vätska (högst ett halvt glas).

Om du har diabetes som kräver insulinbehandling är den allmänna anvisningen att av morgonens långverkande insulin kan 2/3 injiceras och korttidsverkande (måltidsinsulin) tas inte på morgonen. Om din sjukdom kräver strikt balans, ta kontakt med skötaren eller läkaren som behandlar din diabetes.

Om du använder blodförtunnande läkemedel (bl.a. Plavix, Pradaxa, Marevan, Xarelto, Eliquis, Brilique), ta på förhand kontakt med polikliniken för lungsjukdomar på nummer 03 311 63165. Acetylsalicylpreparat (bl.a. Primaspan, Aspirin) kan användas ända till endoskopin.

Ha ett uppehåll på _____ i medicineringen av _____.

Genomförande av endoskopi av luftrören

Du får lugnande medicinering om du vill före undersökningen. Svalget och luftvägarna bedövas med spray. Endoskopin görs med ett böjligt endoskop antingen via näsan eller munnen. Endoskopin tar 10–30 minuter. Vid behov kan lugnande läkemedel användas.

Efter endoskopin

Efter undersökningen vilar du i observationsrummet 2–3 timmar. I allmänhet får du åka hem på eftermiddagen. Du ska inte äta och dricka under två timmar efter endoskopin. Du kan köra bil på undersökningsdagen, men bara om du inte har tagit lugnande läkemedel. Du får sjukledigt för undersökningsdagen.

Symptom efteråt

Under undersökningsdagen kan det förekomma lite blodig upphostning och övergående lätt feber. Mer allvarliga symptom efteråt hemma är mycket ovanliga. Om du har mycket blodiga upphostningar, andnöd, bröstsmärtor eller andra motsvarande symptom eller om du får hög feber, finns det skäl att ta kontakt med Tays akut Acuta eller annan jourhavande poliklinik.

[På Tays webbplats finns en beskrivning av vårdstigen för patienten som genomgått lungingrepp](#)