

Легочные заболевания

## Ультразвуковая бронхоскопия

### Ультразвуковая бронхоскопия (EBUS-бронхоскопия)

EBUS-бронхоскопия выполняется под местной анестезией с помощью тонкого (7 мм) эндоскопа с ультразвуковым датчиком на конце. Во время исследования берутся пробы из-за бронхов с помощью небольшой иглы. Это дает ценную информацию о тканях, находящихся за бронхами. При необходимости одновременно можно также осмотреть лимфатические узлы через пищевод. С помощью ультразвукового датчика меньшего размера при бронхоскопии можно брать образцы из более глубоких тканей легких.

Перед бронхоскопией вы получите предварительные лекарства, а вашу глотку и дыхательные пути анестезируют обезболивающей жидкостью. Кроме того, во время EBUS-бронхоскопии внутривенно используются успокоительные и облегчающие кашель препараты. Бронхоскопия проводится либо через нос, либо через рот, и занимает примерно от 30 до 45 минут.

После обследования вас оставят отдыхать в комнате наблюдения на 1-3 часа. В это время все еще необходимо не кушать, так как анестезия глотки и дыхательных путей длится около двух часов. Прием пищи может вызвать попадание пищи в дыхательные пути. Кушать и пить можно примерно через два часа после окончания бронхоскопии.

### Подготовка

На бронхоскопию необходимо прибыть из дому утром, к заранее договоренному времени. На бронхоскопию все пациенты приглашаются в утреннее время. Время в приглашении не является временем обследования, а порядок определяется в течение дня. Выделите для посещения семь часов. **Не ешьте и не пейте в течение шести часов до обследования. Не курите утром в день обследования.**

### Лекарства

Примите прописанные вам для регулярного приема лекарства от сердца, артериального давления и астмы, если врач не сделал других назначений, с небольшим количеством жидкости (не более полстакана).

Если у вас диабет, который лечится инсулином, обратитесь к медсестре по диабету или врачу за более подробными инструкциями о том, как вводить инсулин в связи с процедурой.

**Если** у вас аллергия на обезболивающие вещества или **вы принимаете антикоагулянты** (например, Plavix, Pradaxa, Eliquis, Brilique, Xarelto, Lixania, Marevan) или подкожный «мини-гепарин» (например, Klexane, Innohep), обратитесь заранее в поликлинику легочных заболеваний, позвонив по телефону 03 311 63165.

Прием ацетилсалициловых препаратов (Primaspan, Disperin, Aspirin) можно продолжать вплоть до бронхоскопии.

Легочные заболевания

### Регистрация

Зарегистрируйтесь в поликлинику легочных заболеваний сразу по приходу, используя регистрационный автомат. Счет за бронхоскопию будет отправлен вам по почте.

### Уход домой

Домой обычно возможно вернуться во второй половине дня после получения инструкций по дальнейшему лечению. Предварительные лекарства для EBUS-бронхоскопии («препараты треугольника») вызывают утомляемость и временную потерю внимательности. Поэтому вождение автомобиля в день обследования запрещено. При необходимости на день обследования вы получите больничный. На следующий день после обследования вы можете нормально идти на работу, если больничный не продлен по какой-либо другой причине.

В день обследования может быть небольшой кровавый кашель и кратковременное повышение температуры. Более серьезные последующие симптомы, проявляющиеся дома, бывают крайне редко. Наиболее распространенная проблема, требующая последующего лечения, является бронхит. Если у вас выделяется много крови при кашле, есть затрудненность дыхания, боли в груди или у вас поднялась высокая температура, обратитесь в Tays Первую помощь Acuta или в отделение неотложной помощи поликлиники. Очень редкое осложнение (1:1000 процедур) - развивающийся в средостении абсцесс, который может вызвать длительную повышенную температуру также через 1-2 недели после процедуры.

[На веб-сайте Tays есть описание пути лечения пациента, перенесшего процедуру на легких.](#)