

Tays / Lungsjukdomar

Pleurapunktion

Vad är pleurapunktion?

Pleurapunktion är ett ingrepp där **vätskeprov tas från lungsäcken** med hjälp av en tunn nål. Med hjälp av ingreppet försöker man utreda, varför vätska samlats i lungsäcken och lindra andnöd.

Förberedelser för undersökningen

Om du har blodförtunnande medicinering (t.ex. Marevan, Primaspan, Plavix, Aspirin, Asasantin), kontakta polikliniken för lungsjukdomar, telefon 03 311 63165.

Ha ett uppehåll på _____ i medicineringen av _____.

På ingreppsdagen kan du äta och ta andra läkemedel normalt. Blodprov tas på dig antingen före undersökningen eller efter den. Resultaten från blod- och pleuraproven jämförs med varandra, vilket underlättar diagnosticeringen.

Vid undersökningen

Före punktionen rengörs huden och punktionsområdet bedövas. Efter bedövningen tappas vätska ur pleurasäcken med hjälp av en nål och spruta och nödvändiga prover samlas in. Efter ingreppet sluts punktionsstället med kompresser. Ingreppet tar cirka 15–20 minuter.

Efter undersökningen

Efter ingreppet ska du vila cirka en timme och under den tiden följer vi upp hur du mår. Vid behov kan lungbild tas.

[På Tays webbplats finns en beskrivning av vårdstigen för patienter som genomgått lungingrepp.](#)