

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาภาวะการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง (ไม่มีอาการ) โดยการให้ยา

คุณได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง. แพทย์ที่ให้การรักษาคุณเสนอให้คุณให้ยาในการรักษา. วัตถุประสงค์ของการรักษาก็คือทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคระยะแฝง และต่อเนื่องจากนั้นก็ป้องกันมิให้ป่วยเป็นโรคดังกล่าว. การรักษาโดยการให้ยาจะเริ่มต้นขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ, ตัวคุณเองมีความต้องการและพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการรักษาดังกล่าว. ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองนิยามลูกค้าแล้ว การตรวจและรักษานั้นจะไม่มี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากคุณ.

การรักษาภาวะการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง ทำได้โดยการให้ยารักษาวัณโรครวมกันอยู่ 1-2 ตัวยา.

- อีโซนิอัสซิด (Tubilysin®) ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม
- ริฟมปีซิน (Rimapen®) ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม
- ริฟาเป็นติน (Priftin®) ชนิดเม็ด 150 มิลลิกรัม

ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษานั้นขึ้นอยู่กับตัวยาที่กินรวมกัน. โดยทั่วไปแล้วช่วงเวลาที่จะต้องกินยานั้น อยู่ระหว่าง 3-9 เดือน. จะมีการส่งยาโดยโพลีคลินิกของทางโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะเป็นไปได้โดยส่งไปโดยตรงให้ไปรับจากร้านขายยาภายในเขต หรือส่งโดยใบส่งยาไปให้ทางร้านขายยาประจำโรงพยาบาล.

การใช้ตัวยาอื่น ๆ และยาสมุนไพรอื่น ๆ ในเวลาเดียวกันนั้น จะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ถึงผลรวมของผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์. ฉะนั้นจึงมีความสำคัญยิ่ง, ที่คุณจะต้องบอกกล่าวแก่แพทย์ว่าคุณใช้ยาอะไรอยู่บ้าง.

ยา[แทบจะ]ทุกตัวอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์.

ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์โดยส่วนมากแล้วจะไม่รุนแรง และจะหายไปเมื่อให้ยาต่อ หรือต้องหาวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการบรรเทาผลข้างเคียงดังกล่าว.

ริฟมปีซิน และริฟาเป็นติน

- บัสสาวะ, น้ำลาย, เหงื่อ และน้ำตาจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม. อาการดังกล่าวไม่มีอันตราย, แต่เนื่องจากการเปลี่ยนสีดังกล่าวจึงมิให้ใช้คอนแทคเลนส์.
- ประสิทธิภาพการให้ยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นจะน้อยลง, ฉะนั้นระหว่างการรักษานั้นควรที่จะใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย.
- อาจจะทำให้เกิดภาวะที่ใบหน้าหรือหนังศีรษะแดงกำเริบขึ้นและจะมีอาการคัน 2-3 ชั่วโมงหลังจากการกินยา ริฟมปีซิน. การรักษาอาการต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นอาจทำได้โดยการให้ผลิตภัณฑ์ยาต้านฮิสตามีน.

อีโซนิอัสซิด

- อาจทำให้เกิดภาวะที่เส้นประสาทส่วนปลายเสียหายเล็กน้อย, ซึ่งบ่งได้จากการมีอาการชา, อาการปวด หรือรู้สึกเจ็บแปลบที่มือและเท้า. อาการดังกล่าวป้องกันได้โดยการให้วิตามินบี 6 เพิ่ม.
- อาจจะทำให้ใบหน้าแดงและมีอาการปวดศีรษะกำเริบขึ้น, น้องครั้งที่ทำให้เป็นลม. อาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์อาหารบางอย่างที่มีสารไทรามินและฮิสตามีนอยู่.

ให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว: ซีสสุกต่าง ๆ, ไวน์แดง, ปลาทูน่า, ไข่กรอกแบบซาลามี [ไข่กรอกอบร้อนแบบชาวอิตาลี].

- การมีสิ่วอาจจะแย่มากขึ้น.
อาการดังกล่าวจะทำการรักษาโดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาเฉพาะที่ใช้ในการรักษาสิ่ว.
- ผมอาจจะร่วงมากกว่าปกติ. ภาวะดังกล่าวจะหายไปเมื่อการรักษาสิ้นสุดลง.

ยาต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษาวัณโรคอาจทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ, ฉะนั้นในระหว่างการรักษานี้จะมีการตรวจเลือดเพื่อดูค่าต่าง ๆ ที่บ่งถึงภาวะของตับ ซึ่งจะให้ตรวจอย่างสม่ำเสมอ.

- อาการที่บ่งถึงภาวะดังกล่าว อาจจะเป็น อาการคลื่นไส้เวียน, การอาเจียน หรืออาการปวดที่ท้อง.
สีของเม็ดโปรตีนที่ผิวหนังและตาอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง.
ภาวะอักเสบของตับนั้นเป็นไปได้เช่นกันว่าจะไม่มีอาการ และจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อดูจากผลการตรวจเลือด.
- การดื่มแอลกอฮอล์ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ตับอักเสบเพิ่มสูงขึ้น.
ระหว่างการรักษาโดยการใช้นี้ให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์.

**อาการอื่น ๆ ที่ไม่รุนแรง,
ให้ทำการติดต่อไปยังแพทย์ผู้ให้การรักษาเพื่อทำประเมินถึงภาวะอาการของคุณ [อาการต่าง ๆ ดังกล่าวได้แก่]:**

- ผื่นคัน, ลมพิษ
- คลื่นไส้เวียน, หงุดหงิด และเบื่ออาหาร
- อาการชา, อาการปวด หรือรู้สึกเจ็บแปลบที่มือและเท้า (ตรวจสอบว่าคุณกินวิตามินบี 6 แล้วหรือยัง)
- ความผิดปกติในการนอนหลับ, ซึมเศร้า, สมาธิสั้น, เวียนศีรษะ.

**อาการรุนแรงต่าง ๆ, ซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วจะต้องหยุดการรักษาโดยการใช้นี้.
ให้ทำการติดต่อไปยังแพทย์ผู้ให้การรักษา
หรือให้ไปเข้ารับการรักษาที่หน่วยให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน [päivystys].**

- อาเจียน และ/หรือมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง.
- ตาขาวหรือสีผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลือง.
- มีไข้, มีผื่นขึ้น
- ปัสสาวะน้อยกว่าปกติ, สีของปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีเข้มมาก.
- การมองเห็นบกพร่อง
- มีอาการชัก
- อาการประสาทหลอนทางสายตาหรือหู
- มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย, ภาวะอารมณ์แปรปรวนอย่างรุนแรง
- มีเลือดออกที่เหงือกหรือจมูกอย่างผิดปกติ.

คุณควรที่จะรู้อะไรอีกบ้าง?

การรักษาโดยการใช้นี้สามารถป้องกันการพัฒนาของวัณโรคในผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่รับการรักษา.
อย่างไรก็ตามให้ติดตามเฝ้าดูสุขภาพของคุณ. หากคุณมีอาการไอนาน, มีเสมหะ, เสดอด, เบื่ออาหาร,
น้ำหนักลด, อ่อนเพลียอย่างรุนแรง หรือเหงื่อออกตอนกลางคืน.

อ่านเกี่ยวกับวัณโรคเพิ่มเติมได้จาก: www.tuberkuloosi.fi